

きょうは心房細動週間の真っ最中

日本脳卒中協会は「日本脳卒中協会は、日本脳卒中の発生率を防ぐための必要性を国際法で規定する」ことを目的としている。この規約は、脳卒中の発生率を減らすための具体的な行動計画を定め、各加盟国が実施する。この規約は、脳卒中の発生率を減らすための具体的な行動計画を定め、各加盟国が実施する。

心房細動は発作の
続期間によって「持続性」「永
性」「持続性」「永
性」に分けられます。

左心房の入り江のよう
な部分では血液がよど
みます。体内を流れ
いる血液は固まりませ
んが、よどむと血液は
固まりやすくなりま
す。

保健・福

人生10年時代の健康新管理



【プロフィル】広島県生まれ。1976年広島大学医学部卒業後、聖路加国際病院内科勤務。99年東京医科大学循環器内科主任教授。2020年から現職。総合内科専門医、日本循環器学会専門医、元日本循環器病予防学理長。

でもござります。その段階では、薬や電気ショックなどで洞調律に戻りますが、戻らなくなつた状態が永続性になった房細動です。

心房細動になると、心房は細かく震えるのみで、収縮できなくなつ

1

保健・福利

弱が固まるなど血栓となることがあります。血栓で塞がると、手足の筋肉になると脳梗塞を起こすことがあります。脳梗塞を起こすと、歩けなくなったり、言葉が通じなくなることがあります。脳梗塞の原因は、血管の狭窄や閉塞によって血流が止まることです。脳梗塞のリスク因子として、年齢、高血圧、糖尿病、喫煙、飲酒、肥満、脂質異常症、心臓病、脳卒中既往歴、脳梗塞既往歴があります。脳梗塞のリスク因子を減らすためには、健康的な生活習慣を維持することが重要です。

放置しないで、必ずする確解は「1点で8%、2点で8%、3点で5%、4点で3%、5点で2%、6点で1%」といつてあります。心房細動は脳塞だけでなく、心不全や認知症の原因になってしまいます。心房細動は脳塞だけではなく、心不全や認知症の原因になってしまいます。

◆毎週月曜連載 桐生大学・桐生大學短期大学部副学長の山科章さんは、同大学医療保健学部の学生などに講義も開講している。